Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió finanszírozásával NextGeneration EU

Fenntartható mezőgazdasági vízgazdálkodási ismeretek

ÉGHAJLATI EREDETŰ KÁROK MÉRSÉKLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A MEZŐGAZDASÁGBAN

Konstrukció azonosító: RRF-4.2.1-23-2023-00001

Dr. Goda Zoltán, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VÍZTUDOMÁNYI KAR

Az agrometeorológia alapjai, vízgazdálkodási alapok, aszály monitoring

Bevezetés

Az agrometeorológia történelmi fejlődése

A MEZŐGAZDASÁG ÉS IDŐJÁRÁS KAPCSOLATÁNAK TUDOMÁNYOS MÚLTJA

Ősi megfigyelések

- Az ókori civilizációk (pl. Egyiptom, Mezopotámia) már megfigyelték az időjárás és a terméshozam összefüggéseit.
- Az írás kialakulásáig a megfigyelések és tapasztalatok két generáció között szóban kerültek átadásra.

Korlátozott fejlődés

Az írás megjelenése

- Az írás megjelenésével gyakorlatilag egyidőben jelentek meg az első meteorológiai feljegyzések.
- Ősi naptárak és megfigyelési rendszerek segítették a vetési és aratási ciklusok tervezését.

Az agrometeorológia történelmi fejlődése

A MEZŐGAZDASÁG ÉS IDŐJÁRÁS KAPCSOLATÁNAK TUDOMÁNYOS MÚLTJA

Sumérok, egyiptomiak, kínaiak

- Időjárási események feljegyzése, természeti ciklusok megfigyelése.
- Az egyiptomi papiruszokon a Nílus áradásainak feljegyzése, összehasonlítása.
- A kínaiak Kr. e. 3000 körül rendszeresen rögzítették a csapadékmennyiségeket.

Az ókori görögök

- Az ókori görögök már rendszerezték az időjárási jelenségeket és megpróbálták feltárni azok kiváltó okait.
- Arisztotelész 'Meteorologika' című műve az első tudományos igényű időjárási tanulmány volt.

Az agrometeorológia történelmi fejlődése

A MEZŐGAZDASÁG ÉS IDŐJÁRÁS KAPCSOLATÁNAK TUDOMÁNYOS MÚLTJA

Középkori kolostorok és krónikák

- A középkori szerzetesek rendszeresen dokumentálták az időjárási jelenségeket.
- Szélsőségek, anomáliák feljegyzése
- Az időjárás terméshozamra gyakorolt hatásainak feljegyzése.
- Az információ még korlátozottan tudott terjedni.

Reneszánsz és nyomtatott meteorológiai feljegyzések

- A könyvnyomtatás lehetővé tette az időjárási adatok és információk szélesebb körű terjesztését.
- Ez alapozta meg a modern időjárás-előrejelzést.

Az agrometeorológia történelmi fejlődése

AZ ELSŐ METEOROLÓGIAI MŰSZEREK MEGJELENÉSE

Galilei és a hőmérő

- Galileo Galilei a 16. század végén fejlesztette ki a hőmérőt, amely a tudományos mérések egyik alapvető műszere lett.

Dalton és a páratartalom mérése

- John Dalton 19. századi munkái hozzájárultak a páratartalom és a csapadék pontosabb méréséhez.

Torricelli és a barométer

- Evagelista Torricelli 1643-ban megalkotta a barométert, amely a légnyomás mérésével már az időjárás előrejelzését segítette.

Telegráfia és meteorológiai adatok terjedése

- A 19. században a távíró elterjedése lehetővé tette az adatok gyors továbbítását, megalapozva a modern előrejelzéseket.

Az agrometeorológia történelmi fejlődése

A METEOROLÓGIAI ÉS FENOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK KEZDETEI

Societas Palatina Meteorologica

- Az 1700-as évek végére a németországi Mannheimben.
- 36 állomással, keleti irányban a legtávolabbi állomás Buda volt.
- A légnyomás, a hőmérséklet, a légnedvesség, a felhőzet, a csapadék és a szélirány mérése.

Meteorológiai és Földmágnességi Intézet

- 1870-es évek.
- Az összegyűlt adatokat elemzése és publikálása.
- Az elemzésekben elsősorban a mezőgazdasági szempontok kiemelése.
- Egységes, hivatalos mérések 1901-től.

A fenológiai tudományának kialakulása

- Carl von Linné svéd botanikus elkészített egy útmutatót a vadontermő és a gazdasági növények megfigyelésére.
- Adolphe Quetelet, belga csillagász, 1840 táján egész Nyugat-Európára kiterjedő fenológiai megfigyelő hálózatot szervezett.



LÉGTÜNEMÉNYTAN

S A' KÉT MAGYARHON ÉGALJVISZONYAI

'S EZEK HÉTOLYÁSA

A' NÖVÉNYEKRE ÉS ÁLLATOKRA

ÍRTA

BERDE ÁRON

TERMÉSZET- ÉS VEGYTAN R. TANÁRA.

KOLOZSVÁRT

GYÖRGY BARRÁNÉ ÉS STEIN TULAJDONA.

1847.

Az agrometeorológia történelmi fejlődése

AZ ELSŐ HIVATALOS METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK

Meteorológiai hálózat

- A meteorológiai állomások hálózatba szervezése és az adatok elemzése tette lehetővé az előrejelzések készítését.

Fitzroy és az első hivatalos előrejelzés

- Robert Fitzroy brit tengerésztiszt 1861-ben adta ki az első hivatalos, nyomtatott meteorológiai előrejelzést.

Térképes előrejelzések megjelenése

- A szinoptikus térképek segítették az időjárási rendszerek nagyléptékű elemzését.

Meteorológiai szolgálatok létrehozása

- A 20. századra több országban alakultak hivatalos meteorológiai intézetek, amelyek egységes szempontok alapján végeztek méréseket és készítettek előrejelzéseket.

Hazai fenológiai hálózat

- Staub Mór tanár 1871-ben szervezte meg az első önálló hazai fenológiai hálózatot.
- Elkészítette az első magyar nyelvű fenológiai megyelési útmutatót is.



Az agrometeorológia meghatározása

A METEOROLÓGIAI TERÜLETEI

Fizikai meteorológia

- A fizikai meteorológia a légköri jelenségek és folyamatok fizikai magyarázatával foglalkozik.

Éghajlattan

- Az éghajlattan a több évtizeden át gyüjtött adatok alapján írja le a légkör állapotát.

Szinoptika

- A szinoptika a légkörben lejátszódó folyamatok előrejelzésének módszereit foglalja magába..

Legfontosabb alkalmazott területek

- Biometeorológia, repülésmeteorológia, orvosmeteorológia, agrometeorológia.

Agrometeorológia

- A mezőgazdasági meteorológia (agrometeorológia) a meteorológiának az az ága, amely azokat a mezőgazdasági termelés szempontjából jelentőséggel bíró meteorológiai és klimatológiai viszonyokat tanulmányozza, amelyek kölcsönhatásban vannak a mezőgazdasági termelés tárgyaival és folyamataival.

A fenológia meghatározása

A NÖVÉNYEK ÉS AZ IDŐJÁRÁS KAPCSOLATA



Hatás és válaszreakció

- A növények reagálnak az őket érő ingerekre.
- Képesek detektálni a környezet hatásait (ingerek) és azokra válaszreakciót is tudnak adni.

Változékonyság és homeosztázis

- A növények fejlődését és szaporodását meghatározzák a környezetük körülményei és az őket érő ingerek.
- Ennek ellenére mégis megőrzik önazonosságukat, vagyis homeosztázisuk van.

Fenológiai szakaszok

- K. von Linné: a növény fejlődése különböző szakaszokra bontható és valamennyi szakasz kezdetét új szerv megjelenése jelzi.
- A fejlődési szakaszok elkülönítése külső jegyek alapján történik, ezek a fenológia szakaszoknak, vagy fázisoknak.

Növényfenológia

- A tudománynak azt a területét, amely a növények fejlődési szakaszait az időjárással összefüggésben vizsgálja, növényfenológiának nevezzük.
- Az időjárás azon elemei, melyek hatással vannak a növények életére:

  a napsugárzás, a hőmérséklet, a szél és a csapadék.

A napsugárzás

A napsugárzás

ELEKTROMÁGNESES-, ÉS RÉSZECSKESUGÁRZÁS

A légköri folyamatok motorja a napsugárzás

- A légköri folyamatok fő energiaforrása a Napból érkező részecskesugárzás és elektromágneses sugárzás.

Részecskesugárzás

- elemei ionok, elektromos töltésű részecskék, és töltetlen neutronok.
- az elektromágneses sugárzáshoz képest csak kis hányadát teszi ki a Nap energiájának.

Elektromágneses sugárzás

- Az elektromágneses sugárzás fotonok árama (zérus nyugalmi tömegű részecskék).
- A Napból származó energia táplálja a légkör fizikai folyamatait.

A napsugárzás

AZ ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM

Hullámhossz

- A Nap felszínéből kilépő elektromágneses sugárzás tehát nem más, mint a hullámok formájában tovaterjedő elektromágneses energia.

- Minél rövidebb a sugárzás hullámhossza, annál nagyobb az energiája.

- A rövidebb hullámhossztól a hosszabb felé haladva a következ elektromágneses sugárzásokat különböztetjük meg:

- Gamma-sugárzás
- Röntgensugárzás
- Ultraibolya sugárzás
- Látható fény
- Infravörös sugarak
- Rádióhullámok



A napsugárzás

A NAPSUGÁRZÁS ÉS A LÉGKÖR

Elnyelődés a légkörben

- A légkörbe hatoló napsugárzás a légköri gázokkal kölcsönhatásba kerülve jelentősen módosul.
- A légkör alkotórészei különböző hullámhosszokon elnyelik a napsugárzást (abszorpció).
- Az egyes alkotók más-más hullámhossz-tartományt képesek elnyelni.
- A légkör egyes alkotóinak abszorbeáló hatása alapvető fontosságú a földi élet szempontjából.
- A teljes napsugárzás kb. 50%-a éri el a földfelszínt.



A napsugárzás

AZ ÜVEGHÁZHATÁS



Hullámhossz

- A Földet elérő napsugárzás fele elnyelődik a légkörben.
- A földfelszínt elérő sugárzás egy része elnyelődik, egy része visszasugárzódik a légkörbe.
- A beeső sugárzás felmelegíti a felszínt, és a felszín melegíti fel a közeli levegőréteget.
- A világűr felé induló sugárzás jelentős részét a levegő szén-dioxid és vízgőztartalma nyeli el, majd hővé alakítva visszasugározza a Földre.

Üvegházhatás

A fotoszintézis

A fotoszintézis

A NÖVÉNYEK ENERGIAÁTALAKÍTÁSI FOLYAMATA

A fotoszintézis folyamata

- A növények a napfény energiáját felhasználva szén-dioxidból és vízből cukrot állítanak elő.

A klorofill szerepe

- A klorofill elnyeli az elektromágneses sugárzást a látható fény tartományában és kémiai energiává alakítja.
- Elsősorban a vörös és kék tartományt nyeli el, a zöldet visszaveri – ezért látjuk zöld színűnek a növényeket.

Az ATP és a NADPH szerepe

- A fényszakasz során a növény kémiai energiát állít elő, amelyet szerves molekulák szintézisére használ fel.

A Calvin-ciklus

- A sötét szakaszban a CO_2 beépül a szerves vegyületekbe, létrehozva a növény számára szükséges energiát.

Fotoszintézis

napfény + CO_2 → klorofill → cukor

Klorofill:

elnyeli a **kék** és **vörös** tartományt, visszaveri a **zöldet**.

Fotoszintézis 1.0 – retinaldehid

elnyeli a **sárga** és **zöld** tartományt, visszaveri a **bíbor** színt.

A fotoszintézis

A FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS (PAR)

Mi a PAR?

- A 400-700 nm közötti hullámhosszúságú fény, amelyet a növények a fotoszintézishez használnak.

Fényintenzitás és növekedés

- A magasabb PAR-intenzitás elősegíti a növények biomassza termelését és terméshozamát.

Spektrális összetétel

- A fotoszintézisben legfontosabb a vörös (600-700 nm) és a kék (400-500 nm) hullámhosszúságú tartomány.

Spektrális összetétel

- A PAR-mérők segítik az üvegházi növénytermesztés optimalizálását és a hozamnövekedést.

A fotoszintézis

A SUGÁRZÁSI ENERGIA HASZNOSULÁSA



A fényenergia elnyelése

- A klorofill a beékező napsugárzás 80-90%-át nyeli el a fotoszintézis során.
- A növény a vizet hidrogénre és oxigénre bontja.
- Az oxigén gáz formájában szabadul fel, a hidrogén pedig a légkörből felvett szén-dioxid molekulával egyesülve alkot növényi szénhidrátot.
- $6\ CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

A fotoszintetikus hatékonyság

- A beérkező sugárzás mindössze 3-6%-a alakul át kémiai energiává a fotoszintézis során.

Légzés és hőveszteség

- A növények által felvett energia egy része hőként távozik és játszik szerepet a növény hőháztartásában.

Sugárzási egyensúly

- A növények sugárzási egyensúlya határozza meg a növekedési potenciált és a vízháztartást.

A fotoszintézis

A NÖVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA NAPFÉNYHOSSZÚSÁG SZERINT

Fotoperiodikusság

- A növényeknek azt a tulajdonságát, hogy a nappal, illetve az éjszaka viszonylagos hosszúságára élettani reakciót mutatnak, fotoperiodizmusnak, vagy fényszakaszosságnak nevezzük.

Rövidnappalos növények

- A virágképződéshez naponta 12 óránál rövidebb ideig tartó megvilágításra, de ugyanakkor naponta legalább 8-12 óráig tartó megszakítás nélküli sötétségre van szükségük. (pl. szója, dohány)

Hosszúnappalos növények

- A virágképződéshez naponta 12 óránál hosszabb ideig tartó megvilágításra van szükségük. (pl. saláta, sárgarépa, rozs és a búza)

Naphosszra közömbös növények

- Elsősorban nem a megvilágítás időtartama befolyásolja a növekedést és a virágzást. (pl. napraforgó, paradicsom, uborka)

A hőmérséklet

A hőmérséklet

A HŐMÉRSÉKLET FIZIKÁJA

Hőmérséklet = energia

- A gázok hőmérsékletét az adott gáz részecskéinek sebessége határozza meg.
- A szobahőmérsékletű (20 °C-os) levegő molekulái például 450 m/s (azaz 1620 km/h) átlagsebességgel mozognak.
- A nehezebb gázok lassabb, a könnyebbek gyorsabb mozgást végeznek.
- A hőmérséklet csökkenésével a mozgás sebessége lassul.
- Teljes mozdulatlanság - abszolút nulla fok: -273°K

A három skála

- Farenheit, Celsius, Kelvin

$$°C = K - 273 \qquad K = °C + 273$$

$$°F = \frac{9}{5}°C + 32 \qquad °C = \frac{5}{9}(°F - 32)$$



A hőmérséklet

A HŐMÉRSÉKLET FIZIKÁJA



Az energia forrása a Nap

- Az energia (hő) a Napból származik.
- A napsugárzás felmelegíti a talajfelszínt, a felszín melegíti a levegőt.
- A magasabb légrétegek a konvektív hőáramlások hatására melegszenek.
- A magassággal csökken a hőmérséklet (0,65-1°C/100m)

A hőmérséklet mérése

- Pillanatnyi hőmérséklet
- Napi középhőmérséklet
- Minimumhőmérséklet
- Maximumhőmérséklet
- Hőingás

A hőmérséklet

A HŐMÉRSÉKLET HATÁSA A NÖVÉNYEKRE

Optimális hőmérsékleti tartomány

- A legtöbb növény 15°C és 30°C között fejlődik a legjobban.,
- Hőstressz - hidegtűrés

A hőstressz hatása

- Az optimálisnál magasabb hőmérséklet gátolhatja a fotoszintézist és fokozza a vízveszteséget.

Hőmérséklet és fenológia

- A hőmérséklet szabályozza a csírázást és hatással van a növekedésre, valamint a virágzásra.

Fagy és hidegtűrés

- Egyes növények alkalmazkodnak a fagyhoz, míg mások hidegérzékenyek

A hőmérséklet

TENYÉSZIDŐ ÉS CSÍRÁZÁS

Tenyészidő

- A tenyészidő (április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak)
- Hőösszege, valamint a napsütéses órák összege meghatározza, hogy egy adott növény adott tájon termeszthető-e vagy sem.

Csírázási hőmérséklet

- A növények között a csírázási hőmérséklet tekintetében jelentős különbségek lehetnek.
- A csírázási hőmérséklet egy hőmérsékleti tartományt jelent.

Növényfaj	Minimum	Optimum	Maximum
Búza	2 - 4 °C	15 – 30 °C	30 – 70 °C
Kukorica	8 - 10 °C	32 – 35 °C	44 – 50 °C
Burgonya	8 - 10 °C	19 – 24 °C	30 – 35 °C

A hőmérséklet

TÉLÁLLÓSÁG ÉS HIDEGTŰRÉS

Télállóság, fagyállóság

- A télállóság áttelelő növények esetében értelmezhető.
- A télállóság lényegében a fagy mértéke, amit a növény még képes elviselni.
- A fagyállóság bármely időben fellépő faggyal szemben tanúsított ellenállóképességet jeleni.
- Elfagyás: a növény sejtnedv megfagy és szétroncsolja a sejtet.
- Kifagyás: a növényt felépítő protoplazma fagy meg, elvíztelenedik, ezért pusztul el a növény.

Hidegtűrő képesség

- Az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállóképességet jelenti.
- Egyes növények fagypont feletti hidegben is elpusztulnak, mások valamekkora fagyot elviselnek.
- A növények hidegtűrő képessége fejlődésük különböző szakaszaiban eltérő lehet.



A hőmérséklet

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA



Emelkedő átlaghőmérséklet

- Magyarország éves középhőmérsékletének idősora a globális tendenciákkal összhangban alakul – emelkedő tendenciát mutat.
- Meredek emelkedés az utóbbi évtizedekben.



Várható folytatás

- Az előrejelzések alapján a globális felmelegedés folytatódik.
- A légkör termikus tehetetlenségéből adódóan legalább 1°C emelkedés várható.
- A tényleges (egyensúlyi) globális hőmérséklet emelkedés mintegy 60%-a 25-50 év múlva realizálódik!

A hőmérséklet

AZ EFFEKTÍV HŐÖSSZEG



$$°D = 190{,}2$$

Mi az effektív hőösszeg?

- A növények fejlődéséhez szükséges kumulatív érték, amelyet °C-napban adhatunk meg. jelölése: °D
- Az effektív hőösszeget úgy számítjuk ki, hogy a vegetációs időszak középhőmérsékletét megszorozzuk a vegetációs időszak napjainak számával (vagy a vegetációs időszak napjainak középhőmérsékletét összeadjuk).

Az effektív hőösszeg számítása

m)

Hőösszeg és fenológia

- Meghatározza a vetéstől a betakarításig eltelt időt és a fejlődési szakaszokat.

Agráralkalmazások

- Vetési időpont meghatározása, növényvédelmi időpontok meghatározása.

A csapadék

A csapadék

A CSAPADÉK JELENTŐSÉGE ÉS KÁRA

A csapadék jelentősége

- A csapadék az egyik legfontosabb vízforrás a növények számára, meghatározza a növény fejlődését és a terméshozamot.
- A tartós csapadékhiány visszaveti a növény fejlődését és növeli az öntözési igényt.
- Magyarország jelentős részén (pl. Homokhátság) általános a csapadékhiány és az aszály.

Károkozó csapadék

- A túlzott csapadékmennyiség belvizet okozhat, a talajélet felbomlását és a növény pusztulását okozhatja.
- A jégeső jellemzően a nyári félévben, zivatarok kísérőjelenségeként alakul ki.
- Az ónos eső téli csapadékforma. A magasból folyékony halmazállapotban aláhulló csapadék a felszínen a tereptárgyakra és a növényzetre fagy.

A csapadék

CSAPADÉKFAJTÁK

A csapadék kialakulása

- vízpára kondenzáció (gáz → folyadék)
- vízpára depozíció (gáz → szilárd)

A leggyakoribb csapadékfajták		
Hulló csapadékok		**Nemhulló csapadékok** (A terep tárgyaira csapódnak ki.)
Szilárd halmazállapotúak	Folyékony halmazállapotúak	
Hó, havazás Tartós, mérsékelt intenzitású, közepes nagyságú kristályok.	**Szitálás** A csapadékelemek kis intenzitással esnek. A cseppátmérő 0,006-0,06 mm közötti.	**Harmat** A levegő a talaj közelében a harmatpont alá hűl, de a hőmérséklete még pozitív.
Hózápor Heves, záporjellegű havazás.	**Eső** Mérsékelt intenzitású, és tartós folyamat. Az esőcseppek átmérője 1-3 mm között alakul.	**Dér** A harmat megfagy.
Havas eső Esőcseppek és olvadó hókristályok keveréke.	**Záporeső** Intenzív, heves, rövid ideig tartó folyamat. A cseppátmérő 3-5 mm között is lehet.	**Zúzmara** Ködben a túlhűlt cseppek ráfagynak a terep tárgyaira. **Vízlerakódás** A víz kondenzálódik.
Jégdara Gömb alakú átlátszó szemcsék, átmérőjük 5mm alatt van.		
Jégeső Gömb, golyó alakú, akár tojás nagyságnyi jégdarabok, főként zivatar idején.		
Jégtű Könnyű, hosszúkás alakú jégkristályok.		

A csapadék

A CSAPADÉK MÉRÉSE

Hagyományos mérőeszközök

- A csapadékmérő edények (ombrométerek) egyszerű, de viszonylag pontos mérés biztosítanak.

Automata csapadékmérők

- Digitális, önürítő, télen fűtött csapadékmérők folyamatos adatgyűjtést biztosítanak.

Radar alapú csapadékmérés

- A meteorológiai radarok valós idejű csapadékeloszlás-adatokat szolgáltatnak.

Műhold alapú csapadékmérés

- Globális lefedettséget biztosít, különösen ott szolgáltat értékes adatokat, ahol már mérésre nincs lehetőség.



A csapadék

A CSAPADÉK ELOSZLÁSA, ÉVES INGADOZÁSA



Területi egyenlőtlenségek

- A csapadék területi eloszlása egyenlőtlen lehet, régiónként erősen eltérhet, ami hatással van a termelésre.

Évszakos ingadozások

- Az aszályos és csapadékos időszakok évszakos ingadozása.

Öntözési szükséglet

- A csapadékeloszlás egyenlőtlensége miatt egyes régiókban öntözés nélkül nem fenntartható a mezőgazdaság.

Klimatikus változások

- Az éghajlatváltozás hatására a csapadékeloszlás egyre egyenlőtlenebbé válik.

A párolgás

A párolgás

A PÁROLGÁS FIZIKÁJA

A párolgás folyamata

- A víz halmazállapot-változása, folyadékból gőzzé.
- Endoterm folyamat, azaz az anyag belső energiája nő, hőenergiát vesz fel a környezetéből.

A párolgást befolyásoló tényezők

- Hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség és napsugárzás.

Agronómiai jelentőség

- A párolgás figyelembevétele kulcsfontosságú a vízellátás/öntözés számításához.

A párolgás összetevői

- A talajfelszín párolgása – evaporáció
- A növényzet párologtatása – transpiráció

Evapotranspiráció

A párolgás

A NÖVÉNYEK PÁROLOGTATÁSA, A TRANSPIRÁCIÓ



Mi a transpiráció?

- A növények vízleadása a sztómákon keresztül, amely fenntartja a vízmozgást, keringést és hűti a leveleket.

Befolyásoló tényezők

- Környezeti körülmények: páratartalom, hőmérséklet, légmozgás, napsugárzás.

Jellemző növényi tulajdonság

- A transpiráció mértéke függ a növény fajtájától.

Szabályozási lehetőségek

- A megfelelő növénysűrűség és talajnedvesség-kontroll (talajtakarás) segít a transpiráció ideális mértékének fenntartásában.

A párolgás

TALAJNEDVESSÉG ÉS EVAPORÁCIÓ

A talajnedvesség szerepe

- A növények vízellátásának alapja, meghatározza a csírázást, növekedést, fejlődést.
- A talajban lévő vízgőz befolyásolja a hőmérsékletet és a párolgást.

Az evaporáció folyamata

- A talajfelszínről történő közvetlen vízveszteséget jelenti.
- Mértékét befolyásolja a relatív páratartalom, a hőmérséklet és a szél.
- A vízmérleg negatív (veszteség) oldala.

A párolgás

AZ EVAPOTRANSPIRÁCIÓ SZÁMÍTÁSA

Potenciális párolgás

- Az a vízmennyiség, amelyet a légkör (mint párafelvevő rendszer) a talaj(növényzet) felszínről felvenni képes.
- A vízfelületek párolgása esetén a tényleges párolgás megegyezik a potenciális párolgással.

Meyer-módszer

- Ez egy egyszerűbb módszer, amely főként a hőmérséklet és a napsütéses órák hosszán alapul.

$$P = a \cdot [e(t') - e] \cdot (1 + b \cdot w)$$

Ahol:

- P - a havi párolgás összege (mm/hó)
- E - a vízhőmérséklettől függő közvetlenül a vízfelszín felett lévő légréteg telítési páratartalma (g/m^3)
- E - tényleges pártartalom (g/m^3)
- W - havi közepes szélsebesség (m/s)
- a és b - állandók (értéke éghajlati és földrajzi körülményektől függ. Nálunk 11 és 0,2)

Blaney-Criddle módszer

- Ez egy egyszerűbb módszer, amely főként a hőmérséklet és a napsütéses órák hosszán alapul.

$$ET0 = p \cdot (0{,}46\,T + 8{,}13)$$

Ahol:

- ET_0 = potenciális evapotranszspiráció (mm/nap)
- T = napi átlaghőmérséklet (°C)
- p = az éghajlati tényező (a nappali órák számától és a szélességi foktól függ)
- A Blaney-Criddle egyenlet egy egyszerű lineáris összefüggést ír le az evapotranszspiráció és az átlaghőmérséklet között, amelyet statisztikai elemzéssel állapítottak meg különböző éghajlati viszonyok alapján.

A párolgás

A PÁROLGÁS MÉRÉSE

Párolgásmérő kádak

- Sztenderd méretű edények, ahol az elpárolgott víz mennyisége közvetlenül meghatározható.
- A-típusú kád: felülete kb. 1,14 m2, mélysége 0,25 m.

Wild-féle párolgásmérő

- Egykarú mérleg (tömegmérésen alapul), az elpárolgott víz tömegét méri, ebből számítható a párolgás mértéke.

Lysiméterek

- Speciális eszközök, amelyek a talajnedvesség változásának mérésével határozzák meg a párolgás mértékét.
- hídmérleges: a tartály evapotranspirációs vízveszteségét tömegméréssel határozzák meg.
- úszóházas: légkamrákkal úszóképessé tett tartály által az úszóházban kiszorított vízszintjét egy közlekedőedénnyel csatlakozó mérőtartályban regisztrálják.
- kompenzációs: eredeti felülete 4 m2, mélysége 70 cm, mérendő az a vízmennyiség, amely a talajkád adott vízszintjének tartásához, illetve visszaállításához szükséges.

A belvíz

A belvíz

A FELSZÍNI VÍZBORÍTÁS MEZŐGAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI

A belvíz kialakulása

- A talaj telítődése miatt a felszínen tartós vízborítottság alakul ki.
- Más meghatározás alapján a talajvíztükör felszínre emelkedését jelenti.
- A víz nem tud elszivárogni, mert a talaj felső rétegében a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek.

Legfőbb okai

- Túlzott csapadék, elégtelen vízelvezetés, rossz talajszerkezet, domborzati adottságok.
- Tartósan csapadékos időszakok, intenzív hóolvadás és eső.

Mezőgazdasági károk

- Gyökérfulladás, talajtömörödés, a talajélet felborulása. Jellemző a növénypusztulás és a terméshozam-csökkenés.

A belvíz

A BELVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉSI STRATÉGIÁK

Vízelvezető rendszerek

- Nyílt árkok, dréncsövek, szivattyúrendszerek üzemeltetésével általában kezelhető a probléma.

Precíziós vízgazdálkodás

- Átgondolt vízgazdálkodás, digitális térképek, előrejelzések, szenzorok segíthetik az optimális vízelosztást.

A talajszerkezet javítása

- Monokultúrák mellőzése.
- Talajtakarás, a talajélet fenntartása, szervesanyag utánpótlás.
- Megfelelő vetésszerkezet, vetésforgó.

Vizes területek, vizes élőhelyek revitalizációja

- Adjuk vissza a víznek, ami a vízé!
- Gyakori vízborítottságú területek kivonása a mezőgazdasági művelésből.

A jégeső és a jégkár

A jégeső

A JÉGESŐ KIALALKULÁSA

Meteorológiai háttér

- A jégeső elsősorban nyári zápor jellegű csapadékesemények kísérő jelensége.
- Kialakulásának oka a felhőben tapasztalható fagypont alatti hőmérséklet.
- A kondenzmag köré kifagyott víz jégszemet alkot, amely a felhőből aláhullva a felhő feláramlási zónájába kerülve újra emelkedni kezd.
- A felhőben újabb és újabb jégréteg rakódik rá.

A jégeső kártétele

- Meghatározza a jégeső időtartama, kiterjedése és a jégszemek mérete.
- Levelek, hajtások, virágzat, termések sérülése. Terméshozam-csökkenést, vagy akár a növény teljes pusztulását okozhatja.
- A valaha feljegyzett legnagyobb jégdarab 2010. július 23-án hullott az amerikai Dél-Dakota állambeli Vivian településen. Ez a jégszem 20,3 cm átmérőjű, 47,3 cm kerületű és 0,88 kg tömegű volt.



A jégeső

A JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ RENDSZER

Országos jégkármérséklő rendszer

- Az időjárást befolyásoló rendszer a mezőgazdasági területeken okozott jégkárok csökkentésére.
- A rendszer teljes kapacitással 2018. május elseje óta üzemel.

Működési elve

- Talajgenerátorok segítségével kondenzmagokat (ezüst-jodid) juttatunk a felhőbe – felhőmagvasítás.
- Sok, de apró jégszem keletkezik, amelyek jelentős része elolvad mielőtt földet érne.
- A levegőbe kibocsátott acetonos ezüst-jodid a felhasználást követően a csapadékkal együtt a talajba jut, majd ott lebomlik.

A jégkármérséklő rendszer felépítése

- A Hungaromet Zrt. által kiadott előrejelzés alapján.
- 222 automata jégkármérséklő talajgenerátor,
- 764 emberi közreműködés által működtetett,
- összesen 986 darab jégkármérséklő talajgenerátor.
- A jégkármérséklő rendszer üzemeltetésével kb. felére-negyedére csökkenthető a mezőgazdasági jégkár.
- Nincs negatív hatással a keletkező csapadék mennyiségére…

A jégeső

A JÉGESŐ KIALALKULÁSA



Az aszály

Az aszály

MEGHATÁROZÁS ÉS TÍPUSOK

2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

„Aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs időszakában harminc egymást követő napon belül a) a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy b) a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot.”

Mi az aszály?

- Hosszan tartó csapadékhiányos időszak amely során a talajnedvesség és általában a talaj vízkészlete csökken.

Hatása a növénytermesztésre

- Csökkenti a terméshozamot, fokozza a talajeróziót és növeli az öntözési igényt.

Az aszály típusai

- Meteorológiai aszály
- Mezőgazdasági aszály
- Hidrológiai aszály

Klímaváltozás és aszály

- Az éghajlatváltozás növeli az aszályos periódusok gyakoriságát, tartósságát és intenzitását.

Az aszály

AZ ASZÁLY KIALAKULÁSA, ASZÁLYTÍPUSOK



Az aszály típusai

- Meteorológiai aszály
- Mezőgazdasági aszály
- Hidrológiai aszály

Magyarország aszályossági térképe (Pálfai, 2004)



Az aszály

A METEOROLÓGIAI ASZÁLY



Meghatározás

- A csapadék mennyisége hosszabb időn át kevesebb, mint a területre vonatkozó átlagérték.
- Ez az aszály típus a csapadék hiányára és a megnövekedett hőmérsékletre épül.

Okai

- Elhúzódó anticiklonális időjárási helyzetek, légköri cirkulációs mintázatok változása (pl. Hadley-cella áthelyeződése)

Időtartama

- Hetek, hónapok, évek.

Hatások

- Csökkenő beszivárgás, csökkenő talajnedvesség, perkoláció (átszivárgás).
- Negatív vízmérleg.

Az aszály

A MEZŐGAZDASÁGI ASZÁLY

Meghatározás

- A mezőgazdasági aszály akkor következik be, amikor a meteorológiai aszály hatására a növények nem jutnak elegendő vízhez.
- A mezőgazdasági termelés jelentősen csökken.
- Súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járhat.
- A jelenséget fokozhatja a nem megfelelő öntözési gyakorlat.

Mezőgazdasági technikák

- A mezőgazdasági termelés során alkalmazott technikák és módszerek is segíthetnek az aszály kezelésében.
- Talajtakarás és a talajvíz megőrzése, hatékony vízgazdálkodás.
- Szárazságtűrő növényfajták telepítése.

Az aszály

A HIDROLÓGIAI ASZÁLY

Meghatározás

- Hosszan tartó csapadékhiány, amely vízkészletcsökkenéshez, azaz a folyók, tavak, víztározók és a felszín alatti vizek szintjének csökkenéséhez vezet.

Hatások

- Öntözési problémák, vízellátási problémák, ivóvízhiány, ökoszisztémák károsodása, energiatermelési problémák.

Kialakulás

- Tartós meteorológiai aszály.
- Helytelen vízgazdálkodási módszerek.

Megoldások

- Vízvisszatartás!
- Fenntartható vízgazdálkodás
- Víztakarékos öntözés
- Esővízkezelés, esővízgazdálkodás.



Az aszály

ARIDITÁSI INDEXEK

Péczely-féle ariditási index

$$H = \frac{E\,s}{L \cdot C}$$

- H – ariditási index
- Es – rövidhullámú sugárzási egyenleg (MO-on átlagosan 1760 MJ/m²/év)
- C - évi csapadékösszeg és nyári félév hőmérséklete alapján.

Palmer-féle aszályerősségi index (PDSI)

- a vízháztartás egyes elemeinek a sokévi átlagtól vett módosulása alapján határozza meg a csapadék hiányát vagy többletét.

Standardizált csapadék index (SPI)

- A csapadékmennyiség eltérését méri a hosszú távú átlaghoz viszonyítva.

Magyarország éghajlati körzetei az 1961-1990 időszakban
Péczely osztályozása alapján



Magyarország éghajlati körzetei az 1990-2020 időszakban
Péczely osztályozása alapján



Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer

Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE



Indokoltság

- Magyarországon az aszály jelentős problémákat okoz.
- Gyakorisága, tartóssága növekedő jelleget mutat.
- Az aszály súlyossága évről-évre rekordokat dönt.
- Az aszálykár mindegyik ágazatot érinti, különösen a mezőgazdaságot.

Felépítés és működés

- Az Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer jelenleg 114 darab monitoring állomásból áll.
- Az állomások száma folyamatosan bővül.
- Az egyes állomásokon a hidrometeorológiai adatok mellett különböző mélységekben talajnedvesség adatok mérése is történik.
- A mért adatok alapján a HDI (Hungarian Drought Index) vízhiány index számítható.

A HDI-index

- A HDI index a HDI_0 (meteorológiai vízhiány) index, valamint a HDI_S (vízhiány stressz) indexből tevődik össze.
- A HDI_S a hőmérséklet és csapadék értékek mellett figyelembe veszi a szélsőségesen csapadékhiányos és meleg időjárási helyzetek növényekre gyakorolt hatását is.
- Az adatok nyilvánosan elérhetők: http://aszalymonitoring.vizugy.hu/

Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer

MEGELŐZÉS ÉS FELKÉSZÜLÉS

Felkészülés

- Az elsődleges feladat a felkészülés.
- A vízügy minden év tavaszán a többletvizek betározását célozza meg.
- Amennyiben erre mód és lehetőség adódik a belvíz és az árhullámok vizének megtartása.
- A felhalmozott vízkészlet kulcsfontosságú lehet az aszályos időszak közepén.

Üzemelés

- Kulcsfontosságú feladat a vízkormányzás.
- A vízfolyások és csatornarendszereken keresztül, a zsiliprendszerek alkalmazásával a víz elvezetése oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.
- A vízügyi szervek elsősorban mezőgazdasági célú vízfelhasználás biztosításával foglalkoznak.
- Előfordulhat ökológiai, ipari, technológiai vízszükséglet is.

Gádorosi aszálymonitoring állomás

Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer

KÉSZÜLTSÉGI FOKOZATOK

Jogi háttér

- A vízhiány elleni védekezés részleteit a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet III/B. fejezetében rögzíti.
- A rendelet alapján megkülönböztetünk első-, másod-, harmadfokú, valamint rendkívüli készültséget.
- Az egyes készültségi fokozatok az országosan összesen 84 db vízhiánykezelő körzet területére rendelhetők el.
- A fokozatok elrendelése a vízügyi igazgató hatásköre.

- **Fokozatok**
- Az I. fokú készültség során az érintett vízügyi igazgatóság gondoskodik a szükséges vízkormányzásról, karbantartásról és az üzembiztonságról, továbbá felkészül a további intézkedésekre.

- A II. fokú készültség során az érintett vízügyi igazgatóság az I. fokú készültségnél előírtakon túl gondoskodik a szállítható szivattyúk üzembe állításáról, vízpótlás megkezdéséről, a vízi létesítmények üzemrendjeinek szükség szerinti átalakításáról.

- A III. fokú készültség során az I. és II. fokú készültségre előírtakon túl az érintett vízügyi igazgatóság vízkorlátozásokat vezethet be, valamint minden szükséges lépést megtesz a további vízkészletek biztosításáért.

- A rendkívüli készültség a létfenntartási ivó- és közegészségügyi, katasztrófaelhárítási vízigények kielégítésére irányul.

Záró gondolatok

Záró gondolatok

Éghajlatváltozás

- Az előrejelzések alapján a globális felmelegedés a következő 25-50 évben biztosan folytatódni fog, a jelenlegi 1,5°C eltérés meg is duplázódhat.
- Az éghajlatváltozás következtében az időjárás még szélsőségesebbé válik.
- Jellemzőek lesznek a szélsőséges csapadékesemények és a tartós, gyakori aszályos időszakok.
- Az évszakok átrendeződnek, de ez a folyamat még jelenleg is tart.

Vízkészlet és vízgazdálkodás

- Az éghajlatváltozás minőségi és mennyiségi értelemben is negatív hatást fejt ki a felszíni és felszín alatti vízkészletünkre.
- A vízgazdálkodás folyamatos megújítására van szükség.
- Előtérbe kell kerüljön a vízmegtartás, az elvezetés és lecsapolás helyett.
- Adjuk vissza a tájnak a vizet!
- A mezőgazdaságban is folyamatos megújulásra és adaptációra van szükség. (szárazságtűrő növényfajták használata, talajnedvesség-megtartó technológiák alkalmazása, no-till technikák, monokultúrák arányának csökkentése)

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió finanszírozásával NextGeneration EU

Köszönöm a figyelmet!

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VÍZTUDOMÁNYI KAR

Felhasznált irodalom

- http://earth.geo.u-szeged.hu/index.php/hu/2-uncategorised/114-korny-valt-alfold
- https://2010-2014.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf
- https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/felhasznalt_adatok/
- https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/altalanos_leiras/
- Bihari Z., Kovács T., Lakatos M., Móring A., Nagy A., Németh Á., Szentimrey T., Vincze E., 2012: Aszályok Magyarországon (DMCSEE projekt, 16,26, 36-41p)
- Pálfai I., 2009: Aszályos évek a Kárpát-medencében a 18–20. században- Klíma füzetek, 2009/57. szám, 107-112p
- Pálfai I. 2010: Az aszályok gyakorisága a Kárpát-medencében az utóbbi háromszáz évben- Klíma füzetek, 2010/59. szám, 42-45p
- https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/5_3112_001_101115.pdf
- https://www.ovf.hu/arvizvedelem-vizkarelharitas/aszaly-elleni-vedelem